안면신경마비 한의표준임상진료지침

중추신경계 질환 유무 (출혈, 경색, 종양 등) → No → 외상 병변 유무 → 영상의학검사(CT, MRI)

- Yes → 중추성 안면마비
- No → (비외상성) 말초성 안면신경마비
- Yes → 외상성 말초성 안면신경마비

육안적 평가

① House Brackmann scale / ② Yanagihara's unweighted grading system

- Grade(I ~V) → 높음 → 예후 불량
- Grade(I ~V) → 낮음 → 예후 양호
- Score(0~40) → 낮음 → 예후 불량
- Score(0~40) → 높음 → 예후 양호

기기를 사용한 평가

① EMG, ENoG / ② sEMG / ③ DITI

- ① Axonal loss 값 ② Degeneration ratio → 높음 → 예후 불량
- ① Axonal loss 값 ② Degeneration ratio → 낮음 → 예후 양호
- 마비측/건측 ratio
- 안면부 온도 → 낮음 → 예후 양호
- 안면부 온도 → 높음 → 예후 불량
- 예풍(TE17) 온도 → 높음 → 예후 양호
- 예풍(TE17) 온도 → 낮음 → 예후 불량

이후통 유무

- Yes → 약침치료
- Yes or No

약침치료

- 환측 예풍(TE17)에 봉약침 (skintest 후 시술), 소염 (R25, B/Low) ※ 단, 이후통 감소에만 유효성 인정됨

부항치료

- 환측 예풍(TE17)에 부항요법 시행(자락관법) (R31, C/Low)

침치료

- 침치료를 시행 (R6, A/Moderate)
- 침치료시 득기 유발 (R8, B/Moderate)
- 환측 지창(ST4), 협거(ST6), 양백(GB14), 예풍(TE17), 하관(ST7), 건측 합곡(LI4) 취혈
- 기본 혈위 외 수구(GV26), 사백(ST2), 관료(SI18), 거료(ST3), 열결(LU7), 화료(LI19), 청회(GB2) 등의 선혈

전침치료

- 침치료와 병행 (R14, B/ Moderate)

기타침치료

- 두침요법 병행 (C/Low)
- 동씨침 or 평행침 치료 병행 (C/Low)

약침치료

- 침과 약침치료 병행 (R22, C/Very Low)
- 침과 봉약침 치료 병행

※ 봉약침은 skin test 후 시술

레이저침치료

- 침치료, 레이저침치료 병행 (R34, C/Low)

뜸치료

- 침치료와 뜸치료 병행 (R28, C/Low)

한방물리치료

- 침치료, 물리치료 병행
- 침치료, 안면운동 병행 (R35, C/Moderate)

한약치료

- 견정산, 이기거풍산, 보중익기탕 등 사용 (R21, GPP/CTB)

(단,환자 개개인의 상태와 특성에 따라 변증을 통해 투여 처방을 결정)

변증 치료

풍사외습(風邪外襲)

- 치법 : 거풍통락
- 침구치료 : 풍지(GB20), 지창, 협거(ST6), 사백(ST2), 양백(GB14), 합곡(LI4)
- 한약 : 견정산가미

허풍내동(虛風內動)

- 치법 : 양혈식풍
- 침구치료 : 협거(ST6), 지창(ST4), 영향(LI20), 사백(ST2), 관료(SI18), 풍지(GB20), 족삼리(ST36)
- 한약 : 사물탕합견정산가감

기혈어조(氣血瘀阻)

- 치법: 행기활혈, 거풍통락
- 침구치료 : 협거(ST6), 지창(ST4), 영향((LI20), 관료(ST2), 족삼리(ST36), 태충(LR3), 풍지(GB20)
- 한약 : 당귀보혈탕 합 도홍사물탕가감



발병 3개월 이상

- Yes → 매선치료
- Yes → 약침치료

매선치료

- 침과 매선치료 병행 (R26, C/Low)

약침치료

- 침과 자하거약침 병행 (R24, C/Low)

Notice 한의표준임상진료지침은 한의사와 환자가 적절한 의료서비스를 결정할 수 있도록 돕기 위해 체계적으로 개발한 가이드라인으로, 임상현장에서 참고하여 활용할 수 있습니다. 본 지침은 한의표준임상진료지침 개발사업을 통해 인증 받았습니다.

NIKOM 한국한의약진흥원