


견비통 한의표준임상진료지침

알고리즘



권고안

R1	성인 견비통 환자의 통증 및 가동범위 개선을 위해 일반침치료를 시행해야 한다.	A/Moderate	R10	성인 견비통 환자의 통증, 기능 및 삶의 질 개선을 위해 운동치료에 비해 침치료와 운동치료를 함께 시행하는 한의복합치료를 고려해야 한다.	B/Low
R2	성인 견비통 환자의 통증 및 가동범위 개선을 위해 전침치료를 시행해야 한다.	A/Moderate	R11	성인 견비통 환자의 통증 개선을 위해 한의동상치료와 화침치료를 함께 시행하는 한의복합치료를 시행할 것에 대한 임상질문에 대해서 권고안을 비도출한다.	Inconclusive
R3	성인 견비통 환자의 가동범위 개선을 위해 온침치료를 시행할 것을 고려할 수 있다.	C/Low	R12	성인 견비통 환자의 기능 및 삶의 질 개선을 위해 뜸치료를 포함한 한의복합치료를 고려할 수 있다.	C/Low
R4	성인 견비통 환자의 통증, 기능 및 삶의 질 개선을 위해 의과통상치료(진통소염제, 도수치료)에 비해 침도치료를 시행할 것을 고려할 수 있다.	C/Low	R13	성인 견비통 환자의 증상(통증, 가동범위, 기능 및 삶의 질) 개선을 위해 약침치료를 포함한 한의복합치료를 고려할 수 있다.	C/Low
R5	성인 견비통 환자의 증상개선(통증, 가동범위, 기능 및 삶의 질 개선)을 위해 진통소염제 복용에 비해 약침치료를 고려할 것을 전문가 합의에 기반하여 권고한다.	GPP	R14	성인 견비통 환자의 증상(통증, 가동범위, 기능 및 삶의 질) 개선을 위해 매선치료를 포함한 한의복합치료를 시행할 것을 전문가 합의에 기반하여 권고한다.	GPP
R6	성인 견비통 환자의 증상개선(통증, 가동범위, 기능 및 삶의 질 개선)을 위해 진통소염제 복용에 비해 부항치료를 고려할 수 있다.	C/Low	R15	성인 견비통 환자의 통증 및 가동범위 개선을 위해 부항치료를 포함한 한의복합치료를 고려해야 한다.	B/Low
R7	성인 견비통 환자의 증상(통증, 가동범위, 기능 및 삶의 질) 개선을 위해 추나치료를 시행할 것을 고려할 수 있다.	C/Low	R16	성인 견비통 환자의 증상(통증, 가동범위, 기능 및 삶의 질) 개선을 위해 추나치료를 포함한 한의복합치료를 고려할 수 있다.	C/Low
R8	성인 견비통 환자의 기능 및 삶의 질 개선을 위해 생활관리에 비해 도인운동치료를 고려할 수 있다.	C/Low	R17	성인 견비통 환자의 증상(통증, 가동범위, 기능 및 삶의 질) 개선을 위해 도인운동치료와 침치료를 함께 시행하는 한의복합치료를 고려할 수 있다.	C/Low
R9-1	성인 견비통 환자의 증상개선(통증, 가동범위, 기능 및 삶의 질)을 위해 한약외용제의 적용을 고려해야 한다.	B/Moderate	R18	성인 견비통 환자의 통증 및 가동범위 개선을 위해 한약치료(한약 경구복용)를 포함한 한의복합치료를 고려할 수 있다.	C/Low
R9-2	성인 견비통 환자의 증상개선(통증, 가동범위, 기능 및 삶의 질)을 위해 한약 경구복용을 시행할 것을 전문가 합의에 기반하여 권고한다.	GPP			